Wallonie

LONTZEN

Baum Verteilungsaktion

Distribution d'Arbres



28/11/26

Von 8Uhr bis 11Uhr / De 8h à 11h

Am Gemeindehaus
Kirchstraße, 46

A la Maison Communale
Rue de l'Eglise, 46

Jahr der Sperlingsvögel

Année des Passereaux

RUBUS IDAEUS - FRAMBOISIER
(ROSACÉES)


CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 1-2m
- **Envergure :** 1m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** soutenue
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** mai-août
- **Fructification :** framboise ; juin à octobre
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** intérêt pour la faune
- **Autre(s) caractéristique(s) :** fruits comestibles

Zones bioclimatiques compatibles







		Niveau trophique					
		AA	A	aa	a	n	b
Niveau hydrique	XX						
	X	■	■	■	■	■	■
	m	■	■	■	■	■	■
	f	■	■	■	■	■	■
	h						
	hh						
	H						



***AA :** très acide / **A :** acide / **aa :** assez acide / **a :** faiblement acide / **n :** neutre / **b :** calcaire*
***XX :** très sec / **X :** sec / **m :** mésophile / **f :** frais / **h :** assez humide / **hh :** humide / **H :** mouillé-inondé*

FRAMBOISIER

RIBES RUBRUM - GROSEILLER ROUGE
(GROSSULARIACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles



CARACTÉRISTIQUES

- **Hauteur à terme :** 1,5-2m
- **Envergure :** 1m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** lente
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE

- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout sauf Haute-Ardenne et Ardenne centro-orientale
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** avril-mai
- **Fructification :** baie ; juillet-août
- **Espèce entomophile :** **oui** | non

DIVERS

- **Intérêt en haie :** fruit comestible ; intérêt pour la faune
- **Autre(s) caractéristique(s) :** espèce de demi-ombre





Niveau hydrique	Niveau trophique						
		AA	A	aa	a	n	b
	XX						
	X						
	m						
	f			■	■	■	
	h			■	■	■	
	hh			■	■	■	
	H						

***AA :** très acide / **A :** acide / **aa :** assez acide / **a :** faiblement acide / **n :** neutre / **b :** calcaire*
***XX :** très sec / **X :** sec / **m :** mésophile / **f :** frais / **h :** assez humide / **hh :** humide / **H :** mouillé-inondé*



GROSEILLER ROUGE

Zones bioclimatiques compatibles



VIBURNUM LANTANA - VIORNE LANTANE
(CAPRIFOLIACÉES)



CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 1-3m
- **Envergure :** 1-3m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** lente
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** Haute et Basse Lorraine ; Thiérache ; Sambre-et-Meuse et Condroz; Fagne/Famenne/Calestienne
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** mai-juin
- **Fructification :** drupe ovoïde ; automne
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** biodiversité





		Niveau trophique					
		AA	A	aa	a	n	b
Niveau hydrique	XX						
	X				■	■	■
	m				■	■	■
	f				■	■	■
	h				■	■	■
	hh				■	■	■
	H						

***AA :** très acide / **A :** acide / **aa :** assez acide / **a :** faiblement acide / **n :** neutre / **b :** calcaire*
***XX :** très sec / **X :** sec / **m :** mésophile / **f :** frais / **h :** assez humide / **hh :** humide / **H :** mouillé-inondé*

VIORNE LANTANE

Zones bioclimatiques compatibles



SAMBUCUS RACEMOSA - SUREAU À GRAPPES
(CAPRIFOLIACÉES)

CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 1-4m
- **Envergure :** 2-3m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** rapide
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout sauf Hesbino-brabançon
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** avril-mai
- **Fructification :** baie ; fin été-automne
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** biodiversité







Niveau hydrique	Niveau trophique						
		AA	A	aa	a	n	b
	XX						
	X						
	m	■	■	■	■	■	■
	f	■	■	■	■	■	■
	h	■	■	■	■	■	■
	hh						
	H						

AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

SUREAU À GRAPPES

Zones bioclimatiques compatibles



CRATAEGUS MONOGYNA - AUBÉPINE À UN STYLE
(ROSACÉES)



CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 4-10m
- **Envergure :** 5m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** modérée
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** avril-juin
- **Fructification :** cenelles ovoïdes rouges ; septembre-novembre
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** très tolérante à l'ombrage ; bois très dur
- **Autre(s) caractéristique(s) :** résistance à la sécheresse ; sensibilité au feu bactérien (*Erwinia amylovora*)
- **Précautions :** se distingue de l'aubépine à deux styles par la forme plus lobée des feuilles et la présence d'un seul noyau dans les fruits





Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X			■	■	■	■
m			■	■	■	■
f			■	■	■	■
h			■	■	■	■
hh						
H						

***AA :** très acide / **A :** acide / **aa :** assez acide / **a :** faiblement acide / **n :** neutre / **b :** calcaire*
***XX :** très sec / **X :** sec / **m :** mésophile / **f :** frais / **h :** assez humide / **hh :** humide / **H :** mouillé-inondé*

AUBÉPINE À UN STYLE

SALIX CAPREA - SAULE MARSAULT
(SALICACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles






CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 3-15m
- **Envergure :** 10m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** très soutenue
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** (février)-mars-avril
- **Fructification :** capsule tomenteuse ; avril-mai
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** mellifère précoce
- **Autre(s) caractéristique(s) :** espèce pionnière ; parfois envahissant







Niveau hydrique	Niveau trophique					
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X		■	■	■	■	■
m		■	■	■	■	■
f		■	■	■	■	■
h		■	■	■	■	■
hh		■	■	■	■	■
H						

__AA__ : très acide / __A__ : acide / __aa__ : assez acide / __a__ : faiblement acide / __n__ : neutre / __b__ : calcaire
__XX__ : très sec / __X__ : sec / __m__ : mésophile / __f__ : frais / __h__ : assez humide / __hh__ : humide / __H__ : mouillé-inondé

SAULE MARSAULT

Zones bioclimatiques compatibles



SORBUS AUCUPARIA - SORBIER DES OISELEURS
(ROSACÉES)

CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 5-15m
- **Envergure :** 4m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** soutenue
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** min 500mm
- **Température annuelle moyenne :** 7 à 11°C
- **Floraison :** mai-juin
- **Fructification :** sorbe ; fin août-septembre
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** baies très recherchées par les oiseaux
- **Autre(s) caractéristique(s) :** supporte très bien le recépage









		Niveau trophique					
		AA	A	aa	a	n	b
Niveau hydrique	XX						
	X	■	■	■	■	■	■
	m	■	■	■	■	■	■
	f	■	■	■	■	■	■
	h	■	■	■	■	■	■
	hh						
	H						

AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

Accéder à la fiche détaillée du « fichier écologique des essences »

SORBIER DES OISELEURS

PYRUS COMMUNIS - POIRIER COMMUN

(ROSACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





© ASBL Centre de Michamps

CARACTÉRISTIQUES

- **Hauteur à terme :** 8-20m
- **Envergure :** 6m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** lente
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE

- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout sauf Haute Ardenne et Ardenne centro-orientale
- **Précipitations annuelles totales :** min 600mm
- **Température annuelle moyenne :** min 7°C
- **Floraison :** avril-mai
- **Fructification :** poire ; septembre
- **Espèce entomophile :** oui | non



© ASBL Centre de Michamps



© ASBL Centre de Michamps



DIVERS

- **Intérêt en haie :** intérêt biologique élevé ; bois de qualité
- **Autre(s) caractéristique(s) :** bois de qualité ; résistant à la sécheresse ; très héliophile et sensible à l'engorgement en eau du sol

Niveau hydrique	Niveau trophique AA	A	aa	a	n	b
XX						
X			■	■	■	■
m			■	■	■	■
f			■	■	■	■
h			■	■	■	■
hh						
H						

***AA** : très acide / **A** : acide / **aa** : assez acide / **a** : faiblement acide / **n** : neutre / **b** : calcaire*
***XX** : très sec / **X** : sec / **m** : mésophile / **f** : frais / **h** : assez humide / **hh** : humide / **H** : mouillé-inondé*

Accéder à la fiche détaillée du « fichier écologique des essences »

POIRIER COMMUN

CARPINUS BETULUS - CHARME COMMUN
(BETULACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 15-20m
- **Envergure :** 10m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** modérée à élevée
- **Persistance :** marcescent
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** min 650mm
- **Température annuelle moyenne :** 7-11°C
- **Floraison :** longs châtons ; avril-mai
- **Fructification :** akènes en grappes pendantes ; septembre
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** espèce envisageable pour les taillis linéaires ; charmilles ; excellent bois de chauffage
- **Autre(s) caractéristique(s) :** très tolérante à l'ombrage
- **Précautions :** se distingue du hêtre par la présence de nervures marquées et l'écorce gaufrée (en relief)



Niveau hydrique	Niveau trophique						
		AA	A	aa	a	n	b
	XX						
	X			■	■	■	
	m			■	■	■	
	f			■	■	■	
	h						
	hh						
	H						

***AA :** très acide / **A :** acide / **aa :** assez acide / **a :** faiblement acide / **n :** neutre / **b :** calcaire*
***XX :** très sec / **X :** sec / **m :** mésophile / **f :** frais / **h :** assez humide / **hh :** humide / **H :** mouillé-inondé*

Accéder à la fiche détaillée du « fichier écologique des essences »

CHARME COMMUN

Zones bioclimatiques compatibles





CASTANEA SATIVA - CHÂTAIGNIER
(FAGACÉES)

CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 25m
- **Envergure :** 15m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** élevée
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** Haute et Basse Lorraine ; Fagne/Famenne/Calestienne (pas optimal) ; Plaines et vallées scaldisiennes ; Hesbino-brabançon ; Sambre-et-Meuse et Condroz
- **Précipitations annuelles totales :** min 700mm
- **Température annuelle moyenne :** 8-15°C
- **Floraison :** longs châtons dressés ; juin-juillet
- **Fructification :** châtaignes comestibles (variétés multiples) ; septembre-octobre
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** espèce envisageable pour les taillis linéaires ; production de fruits
- **Autre(s) caractéristique(s) :** sensible à la compaction des sols ainsi qu'à l'engorgement temporaire en eau



Niveau hydrique	Niveau trophique						
		AA	A	aa	a	n	b
	XX						
	X						
	m	■	■	■			
	f	■	■	■			
	h						
	hh						
	H						



© Jean Marot

***AA :** très acide / **A :** acide / **aa :** assez acide / **a :** faiblement acide / **n :** neutre / **b :** calcaire*
***XX :** très sec / **X :** sec / **m :** mésophile / **f :** frais / **h :** assez humide / **hh :** humide / **H :** mouillé-inondé*

Accéder à la fiche détaillée du « fichier écologique des essences »

CHÂTAIGNIER

FAGUS SYLVATICA - HÊTRE COMMUN
(FAGACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





CARACTÉRISTIQUES

- **Hauteur à terme :** supérieur à 25m
- **Envergure :** 20m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** moyenne en conditions de plein découvert
- **Persistance :** marcescent
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE

- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout et en accompagnement en Moyenne-Belgique (sensibilité accrue à la sécheresse)
- **Précipitations annuelles totales :** min 750mm
- **Température annuelle moyenne :** 3 à 12°C
- **Floraison :** avril-mai
- **Fructification :** septembre-octobre
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS

- **Intérêt en haie :** structuration verticale ; perchoir ; abri pour le bétail ; renforcement paysager de la variété pourpre
- **Autre(s) caractéristique(s) :** qualité du bois appréciée si absence de fourche ; espèce très tolérante à l'ombrage ; apporte un ombrage fort ; bois de chauffage de qualité



Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X						
m			■	■	■	■
f			■	■	■	■
h						
hh						
H						



***AA :** très acide / **A :** acide / **aa :** assez acide / **a :** faiblement acide / **n :** neutre / **b :** calcaire*
***XX :** très sec / **X :** sec / **m :** mésophile / **f :** frais / **h :** assez humide / **hh :** humide / **H :** mouillé-inondé*

Accéder à la fiche détaillée du « fichier écologique des essences »

HÊTRE COMMUN

Zones bioclimatiques compatibles



QUERCUS PETRAEA - CHÊNE SESSILE
(FAGACÉES)



CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 25-30m
- **Envergure :** 15m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** moyenne en conditions de plein découvert
- **Persistance :** marcescent (au stade juvénile)
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** min 600mm
- **Température annuelle moyenne :** 7 à 13°C
- **Floraison :** avril-mai
- **Fructification :** septembre-octobre
- **Espèce entomophile :** oui | non



DIVERS
- **Intérêt en haie :** structuration verticale régulière ; perchoir ; abri pour le bétail
- **Autre(s) caractéristique(s) :** qualité du bois appréciée ; résistance à la sécheresse ; résistance aux vents
- **Précautions :** se différencie du chêne pédonculé par l'absence de pédoncule (les glands sont directement positionnés sur les rameaux)



Niveau hydrique	Niveau trophique						
		AA	A	aa	a	n	b
	XX						
	X		■	■	■	■	
	m		■	■	■	■	
	f		■	■	■	■	
	h						
	hh						
	H						

***AA** : très acide / **A** : acide / **aa** : assez acide / **a** : faiblement acide / **n** : neutre / **b** : calcaire*
***XX** : très sec / **X** : sec / **m** : mésophile / **f** : frais / **h** : assez humide / **hh** : humide / **H** : mouillé-inondé*

Accéder à la fiche détaillée du « fichier écologique des essences »

CHÊNE SESSILE